



Hereeltávolítás (Orchidectomia)

Tartalomjegyzék

Hereeltávolítás (orchidectomia).....	3
Mi a hereeltávolítás?	3
Mi történik a műtéti beavatkozás során?	3
Van-e kockázata a sebészeti beavatkozásnak?	3
Melyek a hereeltávolítás mellékhatásai?	3
Mi történik akkor, ha a rosszindulatú daganat tovább nő?	4
Jegyzetek és kérdések	4
Megjegyzések és kérdések	5

Ezt a tájékoztatót az Európai Urológus Társaság (European Association of Urology, EAU) készítette, és 2021 májusában frissítette. Ez a fejezet a hereeltávolításról nyújt általános tájékoztatást. Ha az Ön egyéni egészségi állapotával kapcsolatban bármilyen konkrét kérdése van, forduljon orvosához vagy más egészségügyi szakemberhez! Egyetlen weboldal vagy tájékoztató sem helyettesítheti a kezelőorvosával folytatott személyes megbeszélést.

Ezt a fordítást a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének hallgatói készítették szakfordítói projektmunka keretében.

A fordítás a Magyar Urológiai Társaság megbízásából készült.

Közreműködők:

Mr. Eamonn T. Rogers, Galway (Írország)

Dr. Markos Karavitakis, Heraklion (Görögország)

Dr. Pierre Mongiat-Artus, Párizs (Franciaország)

A tájékoztató közérthetőségét laikus betegek csoportja véleményezte.

A fejezet kidolgozását a Ferring Pharmaceuticals támogatta. Tartalmát független szakértők állították össze és az Európai Urológus Társaság (European Association of Urology, EAU) Betegszolgálati Irodája hagyta jóvá.



Hereeltávolítás (orchidectomia)

Hereeltávolítás (orchidectomia)

Mi a hereeltávolítás?

Bizonyos férfi pácienseknek egy orchidectomiának nevezett műtétet javasolhatnak annak érdekében, hogy megfékezzék a prosztatara káros elváltozását. Az orchidectomia egy olyan sebészeti beavatkozás, melynek során eltávolítják mindkét herét.

Az orchidectomiát mint a prostata tumor kezelési módszerét nem javasolják a hormonterápia előtt, de azok a betegek, akik nem kaphatnak hormonterápiát, illetve akiknél a hormonpótlás során komoly mellékhatások jelentkeztek, ebben a kezelésben részesülhetnek.

Mi történik a műtéti beavatkozás során?

Az orchidectomiát helyi érzéstelenítésben végzik, így a beteg bár éber, nem érez semmit. Apró metszést ejtenek a lágyék területén azért, hogy a sebész hozzáférhessen a herékhez, és eltávolítsa azokat az ondószinórról.

A heréket körülvevő szövetet nem távolítják el a beavatkozás során, így a herezacskó nem tűnik teljesen üresnek. Vannak, akik protézist (álherét) kérnek, így a herezacskó ugyanúgy néz ki és ugyanolyan érzést kelt, mintha sajátja lenne. Ha a páciens a protézises megoldást választja, első lépésben eltávolítják a heréket, majd ugyanazon beavatkozás során beültetik a protézist.

Van-e kockázata a sebészeti beavatkozásnak?

Az orchidectomia a kisműtétek közé sorolható, de mint minden műtét, ez is kockázattal jár. A beavatkozás után a betegnek kellemetlen érzése lehet, ha azonban fájdalmat érez, azt rögtön jeleznie kell az orvosnak. A legnagyobb kockázatot a herezacskó bevérzése (hematoma) jelenti.


Gyakori a herezacskó zúzódása, duzzanata, melynek gyógyulása a műtétet követő 2-4 hétig is eltarthat.

A metszés helyén heg marad a bőrön. Ha úgy gondolja, hogy a heg nem gyógyul megfelelően, beszéljen az orvosával, és egyeztessenek kontrollidőpontot, hogy megvizsgálja Önt!

Melyek a hereeltávolítás mellékhatásai?

A hormonterápia során néhány mellékhatást tapasztalhat, mint például:

- hőhullámok
- merevedési zavar
- nemi vágy csökkenése
- súlygyarapodás



Mi történik, ha végül másképp döntök?

A hereeltávolítás visszafordíthatatlan beavatkozás, így biztosnak kell lennie abban, hogy Önnek ez a megfelelő kezelési lehetőség. Annak ellenére, hogy ez egy kisebb műtéti beavatkozás, érthető, hogy a hereeltávolító műtétbe való beleegyezés komoly döntés. Segítséget nyújthat Önnek az, ha beszél olyan más férfakkal, akik hereeltávolító műtéten estek át, hiszen ők megértik, mi vár Önre.

Mi történik akkor, ha a rosszindulatú daganat tovább nő?

Az Ön állapotától és a kezelés céljaitól függően további kezelésre lehet szükség a hereeltávolítás mellett. A kezelőorvosa egyeztetni fog a kezelési tervről. A rák agresszivitásától és stádiumától függően besugárzás, kemoterápia vagy további műtéti beavatkozás jöhet szóba.

Jegyzetek és kérdések

Ezt a tájékoztatót az Európai Urológus Társaság (European Association of Urology, EAU) készítette, és 2021 májusában frissítette. Ez a fejezet a hereeltávolításról nyújt általános tájékoztatást. Ha az Ön egyéni egészségi állapotával kapcsolatban bármilyen konkrét kérdése van, forduljon orvosához vagy más egészségügyi szakemberhez! Egyetlen weboldal vagy tájékoztató sem helyettesítheti a kezelőorvosával folytatott személyes megbeszélést.

European Association of Urology

PO Boks 30016
NL-6803 AA ARNHEM
The Netherlands

E-mail: info.patientinformation@uroweb.org

Honlap: patients.uroweb.org

Európai Urológus Társaság

Postafiók 30016
NL-6803 AA ARNHEM
Hollandia